

Hill's™ Prescription Diet™ y/d™ Feline

Soovitused y/d™ toidule üle minekuks

Küsige oma loomaarstilt

-
-
-
-
-

Lisakasutegurid üldise tervise heaks

-
-
-
-

VANA TOIT	VANA TOIT	VANA TOIT	
PÄEV 1–2	PÄEV 3–4	PÄEV 5–6	PÄEV 7

Kui teie kass juba saab kilpnäärmeravimeid,
konsulteerige oma loomaarstiga.

INSTRUKTSIOONIDE OSA TÄIDAB LOOMAARST

Nädal 4:

Nädal 8:

Kuna joodi saamine teiste toiduallikatega – maiused
muu lemmikloomatoit jne. - võib halvasti mõjuda
madala joodisisaldusega toidu efektiivsusele,
on oluline, et te järgiksite hoolikalt oma loomaarsti
soovitusi söötmise osas ning toidaksite kassi ainult
y/d™ toiduga.

IF YOUR MONEY BACK

www.hillspet.com/hyperthyroidism




Kliiniline toitmine
elukvaliteedi parandamiseks™



Mis on hüpertüreoidism?

Hüpertüreoidism on üsna levinud kasside endokriinhaigus, tihedamini diagnoositud just eakatel kassidel

Kui teie kassil on hüpertüreoidism, siis on tema kilpnääre suurenenud ning toodab liiges koguses kilpnäärmehormooni ja see ei ole soovitatav



Kilpnäärmehormoonid, mida toodab kilpnääre, kasutades selleks toiduga saadavat joodi, aitavad reguleerida olulisi kehafunktsioone, kaasa arvatud kassi:

- Ainevahetus
- Südame töö
- Kehatemperatuur
- Vererõhk
- Seedetrakti (soole) funktsioonid

Ravimata jätmise korral võivad hüpertüreoidismil olla tõsised, mõnikord surmaga lõppevad tagajärjed, kahjustades elutähtsaid organeid nagu süda ja neerud. Hea uudis on see, et see haigus on kergesti kontrolli all hoitav loomaarsti poolt määratud õige ravi abil.



Kasside hüpertüreoidismi tunnused

Hüpertüreoidismi nähud võivad varieeruda oma raskusastmelt, sõltudes sellest kui kaua kass on haige olnud. Kui teie kassil on mõni järgnevatest nähtudest, võtke kohe oma loomaarstiga ühendust:

- Kaalu kadu
- Suurenenud janu
- Suurenenud isu
- Halb naha ja karvkatte olukord
- Hüperaktiivsus
- Kõhulahtisus ja/või oksendamine

Sarnased haigustunnused võivad olla ka kroonilise neerupuudulikkusega ning diabeeti põdevatel kassidel. Teie loomaarst peab tegema uuringud ka nende haiguste suhtes, et kindlustada õige diagnoosi panek.

Viisid hüpertüreoidismi kontrollimiseks

4 põhilist moodust hüpertüreoidismi kontrolli all hoidmiseks on:

1. **Spetsiaalselt koostatud igapäevane dieet:** joodi tarbimise piiramine vähendab kilpnäärmehormooni tootmist
2. **Igapäevane ravimite võtmine:** spetsiaalsed ravimid pärsvad türoidhormooni tootmist.
3. **Radioaktiivse joodi teraapia:** kiiritusravi ebanormaalse kilpnäärmekoe raviks
4. **Operatsioon** tabandunud kilpnäärmekoe kirurgiline eemaldamine




Uus viis kasside hüpertüreoidismi kontrolli all hoidmiseks

Hill's™ Prescription Diet™ y/d™ Feline

lemmikloomatoit on teaduslik läbimurre – esimene ja ainuke kliiniliselt tõestatud toit, mis aitab kontrolli all hoida kasside hüpertüreoidismi ilma lisaravimite, kirurgilise vahelesegamise või radioaktiivse joodi teraapia vajaduseta

Kui teie kassil on diagnoositud hüpertüreoidism, piirab tema söötmine **uue Prescription Diet™ y/d™** toiduga hoolikalt toiduga saadava joodi taset, mille tulemusel väheneb türoidhormooni tootmine ning see aitab teie kassil end paremini tunda



Prescription Diet™ y/d™ piirab joodi tarbimist vähendamaks türoidhormooni tootmist.

