

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

RABISIN, süstesuspensioon

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga 1 ml vaktsiiniannus sisaldab:

Toimeaine(d):

Marutaudi viiruse glükoproteiine..... ≥ 1 TÜ

Adjuvant:

Alumiiniumhüdrosiid.....1,7 mg

Abiained:

Tiomersaal.....0,1 mg

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

3. RAVIMVORM

Süstesuspensioon

4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid

Koer, kass, kärplased, hobune, veis, lammas.

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Koerte, kasside, kärplaste, hobuste, veiste ja lammaste aktiivseks immuniseerimiseks marutaudi vastu.

4.3. Vastunäidustused

Mitte süstida vaktsiini subkutaanselt hobustele.

4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Ei ole.

4.5. Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Vaktsineerida ainult terveid loomi.

Soovitav on loomadele manustada antiparasitaarseid ravimeid vähemalt 10 päeva enne vaktsineerimist.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikult

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Mõnikord võib vaktsineerimine põhjustada paikseid reaktsioone nagu väike paistetust süstekohal, mis taandub enamasti 2 nädala, harvem 4 nädala jooksul.

Väga harvadel juhtudel võib tekkida ülitundlikkusreaktsioon (näopiirkonna turse, erüteem, sügelus, šokk ja oksendamine), mille korral tuleb rakendada sümptomaatilist ravi.

4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Lubatud kasutada tiinuse ajal.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.

4.9. Annustamine ja manustamisviis

Enne kasutamist korralikult loksutada.

Süstida üks 1 ml annus intramuskulaarselt või subkutaanselt (v.a. hobused) järgneva vaktsineerimisskeemi järgi:

Loomaliik			Minimaalne vaktsineerimisiga	Kordusvaktsineerimised
Koerad, kassid			1 süst alates 12 nädala vanusest*	1 aasta pärast esmast vaktsineerimist, edasi intervalliga kuni 3 aastat**
Kärplased			3 kuud	Igal aastal
Hobused	Nooremad kui 6 kuud		1 süst alates 4 kuu vanusest,***, millele järgneb kordusvaktsineerimine 1 kuu pärast	
	Vanemad kui 6 kuud		1 süst	Igal aastal
Veised, lambad	Nooremad kui 9 kuud		1 süst alates 4 kuu vanusest** millele järgneb kordusvaktsineerimine 9-12 kuu vanuses	
	Vanemad kui 9 kuud		1 süst	Igal aastal

*Juhul kass või koer vaktsineeritakse enne 12 nädala vanuseks saamist, tuleb vaktsineerimiskuuri lõpetamiseks teha teine süst vanuses 12 nädalat või hiljem.

** Kordusvaktsineerimised tuleb läbi viia vastavalt kehtivatele riiklikele õigusaktidele.

***Juhul kui hobune, veis või lammas vaktsineeritakse esimest korda enne 4 kuu vanuseks saamist, tuleb vaktsineerimiskuuri lõpetamiseks teha teine süst 4 kuu vanuses või hiljem.

Hobustele manustada ainult intramuskulaarselt.

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Vaktsiini mitmekordsel üleannustamisel ei ole täheldatud teisi kõrvaltoimeid kui loetletud lõigus 4.6.

4.11. Keeluaeg (-ajad)

0 päeva.

5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED

Inaktiveeritud, adjuvanti sisaldav vaktsiin marutaudi vastu.

ATCvet kood: QI07AA02

Pärast manustamist kutsub vaktsiin esile aktiivse immuunsuse marutaudi vastu.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu

Tiomersaal

Alumiiniumhüdroksiid

GMEM keskkond

6.2. Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

6.3. Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.

Kõlblikkusaeg pärast üheannuselise pakendi esmast avamist: koheaselt kasutamiseks.

Kõlblikkusaeg pärast mitmeannuselise pakendi esmast avamist: 8 tundi.

6.4. Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2°C...8°C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida valguse eest kaitstult.

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

Klaaspudel, milles 10 annust vaktsiini, karbis 1 pudel

Klaaspudel, milles 1 annus vaktsiini, karbis 10 pudelit

Klaaspudel, milles 1 annus vaktsiini, karbis 100 pudelit

Karbis 1 blisterit, milles 1 süstal, milles 1 annus vaktsiini

Karbis 10 blisterit, milles igaühes 1 süstal, milles igaühes 1 annus vaktsiini

Karbis 50 blisterit, milles igaühes 1 süstal, milles igaühes 1 annus vaktsiini

Karbis 100 blisterit, milles igaühes 1 süstal, milles igaühes 1 annus vaktsiini

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

MERIAL
29 avenue Tony Garnier
69007 Lyon
Prantsusmaa

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

1371

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

03.02.2006/20.04.2011

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Jaanuar 2015

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.