

PAKENDI INFOLEHT
Canishield, 1,04 g ravimkaelarihm suurtele koertele

1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Beaphar B.V.
Drostenkamp 3
8101 BX Raalte
Holland

Partii vabastamise eest vastutav tootja:

Beaphar B.V.
Oude Linderteseweg 9
8102 EV Raalte
Holland

2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Canishield, 1,04 g ravimkaelarihm suurtele koertele
Deltametriin

3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Üks must ravimkaelarihm, millest eraldub valget pulbrit. Üks 65 cm pikkune ravimkaelarihm (26 g) sisaldab:

Toimeaine:

Deltametriin 1,04 g

4. NÄIDUSTUS(ED)

Veterinaarravimi toime:

- surmav toime kirpude (*Ctenocephalides felis*) vastu kestab 16 nädalat;
- surmav toime võsapuukide (*Ixodes ricinus*) vastu kestab 6 kuud;
- peletav ja surmav toime liivakärbeste (*Phlebotomus perniciosus*) vastu kestab 5,5 kuud.

5. VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada alla 7 nädala vanustel kutsikatel.

Mitte kasutada nahakahjustustega koertel.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

Mitte kasutada kassidel. Deltametriin on kassidele kahjulik.

6. KÕRVALTOIMED

Harvadel juhtudel on täheldatud paikseid nahareaktsioone (sügelus, punetus, karvade väljalangemine) kaelal või muudel kehaosadel. Väga harvadel juhtudel on teatatud ka käitumisega seotud muutustest (nt letargia või hüperaktiivsus), mis sageli on seotud nahaärrituse tekkega.

Väga harvadel juhtudel on täheldatud seedetrakti sümptomeid, nagu oksendamine, kõhulahtisus ja liigne süljeeritus.

Väga harvadel juhtudel on täheldatud neuromuskulaarseid häireid, nagu koordineerimata liigutused ja lihasvärinad. Sümptomid taanduvad üldjuhul 48 tunni jooksul pärast ravimkaelarihma eemaldamist.

Kui ilmneb ükskõik milline neist sümptomitest, tuleb kaelarihm eemaldada ja on soovitatav konsulteerida veterinaararstiga.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:

- väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast)
- sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st ravitud loomast)
- aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st ravitud loomast)
- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10000-st ravitud loomast)
- väga harv (vähem kui 1-l loomal 10000-st ravitud loomast, kaasaarvatud üksikjuhud)

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et veterinaararv ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti.

7. LOOMALIIGID

Koer

8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA -MEETOD

Ainult välispidiseks kasutamiseks. Koerale tuleb kaela ümber kinnitada üks ravimkaelarihm.

9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS



Eemaldage ravimkaelarihm kaitseümbrisest vahetult enne kasutamist. Paigaldage ravimkaelarihm looma kaela ümber mitte liiga lõdvalt ega ka liiga tihedalt: kaelarihma ja koera kaela vahele peaks mahtuma kaks sõrme. Lõigake ära üleliigne osa, mille pikkus ületab 5 cm. Kontrollige regulaarselt, kas rihm on paras, ja reguleerige seda, surudes pannalt ja libistades ravimkaelarihma kergesti õigesse asendisse.

10. KEELUAEG

Ei rakendata.

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast tähist EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast kotikese esmakordset avamist: kohe kasutamiseks.

Hoida kotikesi välispakendis.

12. ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Kuna ravimkaelarihma täielik toime avaldub ühe nädala möödumisel, tuleb see loomale kaela ümber panna soovitatavalt 1 nädal enne tõenäolist kokkupuudet parasiitidega nakkusega.

Puugid ja liivakärbsed surevad ja kukuvad maha peremeeslooma pealt maha reeglina vastavalt 48 ja 24 tunni jooksul pärast kokkupuudet, ilma et oleks jõudnud verd imeda. Pärast ravi ei saa välistada üksikute puukide kinnitumist või üksikuid liivakärbestest hammustusi. Seetõttu ei saa nakkushaiguste levikut puukide või liivakärbestega täielikult välistada, kui tingimused on ebasoodsad.

Kui peres on mitu looma, tuleb kirbunakkuse optimaalseks tõrjeks kõiki majapidamises elavaid koeri ravida samal ajal.

Koduloomade kirbud pesitsevad sageli looma pesakorvis, magamisasemel ja harjumuspärastes puhkekohtades, nagu vaibad ja pehme mööbel. Ulatusliku nakkuse korral ja tõrjevahendite kasutusele võtmisel tuleb neid töödelda sobiva insektitsiidiga ning puhastada korrapäraselt tolmuimejaga.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Nahakahjustuste korral eemaldage ravimkaelarihm, kuni sümptomid on kadunud.

Šampoonide mõju toime kestusele ei ole uuritud.

Juhuslik kokkupuude veega ei vähenda ravimkaelarihma toimet.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Ravimi juhuslikul allaneelamisel võivad avalduda kõrvaltoimed, sealhulgas neurotoksiline toime.

Hoida ravim originaalpakendis. Ravimkaelarihma tuleb hoida kuni kasutamiseni kotikeses. Ravimkaelarihma käsitlemise ajal ei tohi suitsetada, süüa ega juua. Lastel ei tohi lubada ravimkaelarihmaga mängida ega panna seda suhu. Ravimkaelarihma jägid või äralõigatud tükid tuleb kohe minema visata. Pärast ravimkaelarihma paigaldamist pesta käed külma veega.

Vältida pikaajalist kokkupuudet ravimkaelarihma või seda kandva koeraga. See puudutab ka voodi jagamist ravimkaelarihma kandvate koertega; eriti oluline on see laste puhul.

Juhuslikul suhu sattumisel või allaneelamisel pöörduda arsti poole ja näidata pakendis olevat infolehte või etiketti.

Deltametriin võib tundlikel inimestel põhjustada ülitundlikkusega seotud (allergilisi) reaktsioone. Inimesed, kes on deltametriini suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga ja ravitud koeraga vältima. Ülitundlikkusreaktsioonide korral pöörduda arsti poole.

Muud ettevaatusabinõud

Deltametriin on mürgine veeorganismidele. Ravimkaelarihma kandvaid koeri ei tohi lasta veekogudesse.

Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Laboratoorsed uuringud ei ole näidanud embrüotoksilist ega arengut mõjutavat toksilist toimet. Veterinaarravimi ohutus koerte tiinuse perioodil ei ole piisavalt tõestatud. Seetõttu tuleb ravimit tiinuse ja imetamise ajal kasutada ainult vastavalt vastutava veterinaararsti kasu-riski suhte hinnangule.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Mitte kasutada koos teiste ektoparasititsiididega, mis sisaldavad organofosfaate.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Kui koer ravimkaelarihma ära sööb (mis on siiski ebatõenäoline), võivad esineda järgmised sümptomid: koordineerimata liigutused, treemor, süljevool, oksendamine, tagakeha kangus. Need sümptomid taanduvad tavaliselt 48 tunni jooksul.

Sümptomaatilise ravi kohta lisateabe saamiseks soovitame pöörduda kohaliku veterinaararsti poole.

Sobimatus

Ei kohaldata.

13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmel tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. Ravim ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele.

14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

September 2018

15. LISAINFO

Pakendi suurused:

Pappkarp, milles on 1 või 2 kaelarihma.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Eesti:

Optimer OÜ

Pärnu mnt 463, Tallinn

10916

Tel: 6081181

optimer@optimer.ee